

QUIPS Basis/ QUIPS ambulant/ QUIPS infant

Warum gibt es eine Änderung im QUIPS Prozessfragebogen?

Wir haben den Applikationsweg der oralen Gabe von Opioiden in zwei Eingabemöglichkeiten aufgeteilt. Sie können nun direkt in der Spalte entweder das retard oder das unretardierte Präparat mit der entsprechenden Dosis eintragen. Auch ist nun die **Eingabe beider Verabreichungsformen gleichzeitig möglich**. Ein Beispiel, der Patient erhält postoperativ auf der Station bis zum Zeitpunkt der Befragung 3x 10mg Oxycodon RET und zusätzlich bei Bedarf wurden 4x5mg Oxycodon Akut (Abbildung 1).

P2 Opioid Applikation	<input type="checkbox"/> keins gegeben		<input type="checkbox"/> nicht erhebbar			
	p.o. unretard	p.o. retard.	i.v.	i.m.	supp.	s.c.
Buprenorphin	<input type="checkbox"/> mg		<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg		<input type="checkbox"/> mg
Fentanyl	<input type="checkbox"/> ** µg		<input type="checkbox"/> µg	<input type="checkbox"/> µg		<input type="checkbox"/> µg
Hydromorphon	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg		<input type="checkbox"/> mg
Morphin	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg
Oxycodon	<input checked="" type="checkbox"/> 20 mg	<input checked="" type="checkbox"/> 30 mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg		<input type="checkbox"/> mg
Oxycodon/(Naloxon)*		<input type="checkbox"/> mg				
Pethidin	<input type="checkbox"/> mg		<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg
Pintramid			<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg		<input type="checkbox"/> mg
Sufentanil	<input type="checkbox"/> *** µg		<input type="checkbox"/> µg	<input type="checkbox"/> µg		<input type="checkbox"/> µg
Tapentadol		<input type="checkbox"/> mg				
Tilidin/(Naloxon)*	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg				
Tramadol	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg	<input type="checkbox"/> mg

* Dosisangaben beziehen sich auf das Opioid **mucosale Applikation *** sublinguale Applikation

Abbildung 1

Weiterhin haben wir die mucosale und sublinguale Applikation klar definiert. Hier die Veränderung am Beispiel. Der Patient erhält postoperativ auf der Station eine PCA mit sublingualen Sufentanil. Sie wählen wie bisher das PCA Verfahren unter S4 aus und können nun die abgeforderte Opioid Gesamtdosis in der Tabelle S2 unter Sufentanil eintragen (Abbildung 2).

S4 Mit PCA	<input type="checkbox"/> keine erhalten	<input type="checkbox"/> nicht erhebbar /** PCA Opioidverbrauch bitte in S2 eintragen
<input type="checkbox"/> PCIA (intravenös)**	<input type="checkbox"/> PCEA (epidural)	<input type="checkbox"/> PCRA (regional) <input type="checkbox"/> PCA (sublingual)**

Abbildung 2

Des Weiteren haben wir Flupirtin unter den Nichtopioiden entfernt, da der Wirkstoff zeitnah aus dem Handel genommen wird.

Insgesamt unterzogen sich alle Medikamente und deren Applikationsweg einer Überprüfung.